



Facultad de
Ciencias de la Salud

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



CURSO DE ORIENTACIÓN Y NIVELACIÓN AL ESTUDIO UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD

EJE TEMÁTICO MATEMÁTICA



COORDINADORAS:

- Lic. Noelia Saleme
- Lic. Patricia Guzmán

Docentes Integrantes:

- Ing. Carlos Alberto Salas
- Ing. Rafael René Herrera
- Lic. Alberto Diaz
- Lic. Maria Isabel Rosales
- Lic. Vanessa Edith Figueroa
- Lic. Jorge Montivero

-AÑO 2024-



Universidad Nacional de Catamarca

Facultad de Ciencias de la Salud

**Curso de Orientación y nivelación al estudio
universitario en Ciencias de la Salud**

EJE TEMÁTICO MATEMÁTICA

Decano:

Dr. Omar T. Barrionuevo

Secretaria Académica:

Lic. Alejandra Machado Nieto

Coordinadoras del área Matemáticas:

Lic. Noelia Saleme

Lic. Patricia Guzmán

Año de ingreso: 2024



ÍNDICE

Contenidos

- LOS NÚMEROS NATURALES Y SUS OPERACIONES	4
- Propiedades de la suma y la multiplicación.....	4
- Propiedad distributiva de la división.....	4
- Potenciación y Radicación de números Naturales.....	5
- Operaciones Combinadas.....	6
- Ejercitación.....	6
- NÚMEROS ENTEROS	7
- Suma, resta, multiplicación y división de números enteros.....	7
- Potenciación y Radicación de números enteros.....	8
- Ejercitación.....	9
- Operaciones combinadas.....	9
- NÚMEROS RACIONALES	10
- Operaciones con números racionales.....	10
- Expresión decimal de un número fraccional.....	12
- Expresión fraccionaria de un número fraccional.....	12
- Conversión de una expresión decimal periódica en fracción.....	13
- Ejercitación.....	13
- Ejercicios combinados.....	14
- RAZONES Y PROPORCIONES	15
- Propiedad fundamental de las proporciones.....	15
- Ejercitación.....	16
- ECUACIONES	16
- Ecuaciones de primer grado.....	16
- Ejercitación.....	17
- Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas: Resolución.....	17
- Ecuaciones de 2do grado.....	19
- Ejercitación.....	20
- RAZONES TRIGONOMÉTRICAS. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS	21
- Triángulos rectángulos y razones trigonométricas.....	21
- Resolución de triángulos rectángulos.....	23



LOS NÚMEROS NATURALES Y SUS OPERACIONES

Las antiguas civilizaciones mesopotámicas representaban los números naturales mediante marcas cuneiformes, que significa figura de cuña y es una pieza terminada en forma de ángulo diedro muy agudo. Su forma se debía a la presión ejercida por la punta de la caña sobre la tablilla de arcilla blanda. La primera operación aritmética conocida fue la suma, utilizando objetos concretos que estuvieran al alcance de la mano: o bien sumaban amontonando piedrecitas o bien formando nudos en una cuerda como hacían los incas.

Los números Naturales: Al conjunto de los números naturales se lo representa con la letra \mathbb{N}

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots, 10, 11, \dots, 100, 101, \dots\}$$

Los números naturales nos sirven para contar: los días de la semana, los alumnos de una clase, el número de estrellas que vemos en el cielo. Además, nos sirven para ordenar: decimos que Júpiter es el 1º planeta en tamaño del sistema solar o que tal persona es la 2ª más alta de su familia.

Los números naturales se pueden sumar y multiplicar y el resultado de esas operaciones es también un número natural. En cambio, no ocurre lo mismo con la resta y la división.

1 - Propiedades de la suma y la multiplicación:

-Asociativa 1:

Suma: $(a + b) + c = a + (b + c)$

multiplicación: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

-Conmutativa 2:

Suma: $a + b = b + a$

multiplicación: $a \cdot b = b \cdot a$

-Existencia del elemento neutro 3:

Suma: es el 0 pues $a + 0 = a$

multiplicación: es el 1 pues $a \cdot 1 = a$

-Distributiva del producto con respecto a la suma y la resta 4:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$$

Ejemplos:

Gracias a las propiedades asociativa y conmutativa, podemos efectuar largas sumas con facilidad, modificando el orden y asociando los sumandos según convenga:

$$40 + 19 + 60 = (40 + 60) + 19 = 100 + 19 = 119$$

$$99 + 15 + 1 = (99 + 1) + 15 = 115$$

La propiedad distributiva nos permite realizar diversas tácticas según nuestras necesidades:

◆ Sacar factor común: $24.3 + 24.5 + 24.2 = 24 \cdot (3 + 5 + 2) = 24 \cdot 10 = 240$

◆ Deshacer paréntesis: $4 \cdot (5 + 3x + 2x^2) = 4.5 + 4.3x + 4.2x^2 = 20 + 12x + 8x^2$

2 - Propiedad distributiva de la división:

Si a , b , c y d son números naturales cualesquiera se cumplen:

$$(a + b) : c = a : c + b : c$$

$$(a - b) : c = a : c - b : c$$



Siempre que las divisiones que resulten sean posibles (su cociente sea un número natural), esto quiere decir que el resto es cero o es una división exacta.

Aclaración: como la división no es conmutativa solo es posible la distributiva por derecha y no por izquierda.

Para saber hacer:

Si en un cálculo aparecen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, se resuelven:

- 1- las operaciones encerradas entre paréntesis.
- 2- las multiplicaciones y divisiones en el orden en el que aparecen
- 3- las sumas y las restas en el orden en el que aparecen

Ejemplos:

a) $8 - 5 + 4 - 3 + 7 = 3 + 4 - 3 + 7 = 7 - 3 + 7 = 4 + 7 = 11$

b) $5 \cdot 4 - 8 + 30 : 5 = 20 - 8 + 6 = 12 + 6 = 18$

También se puede operar quitando el paréntesis como aplicación de la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Si hay varios paréntesis, uno dentro de otros, se comienza efectuando los de dentro.

Ejemplos:

a) $7 - (5 - 3) = 7 - 2 = 5$

b) $24 - 3 \cdot (2 + 4) = 24 - 3 \cdot 6 = 24 - 18 = 6$

Potenciación y Radicación de números Naturales

La potencia natural de un número natural no es más que una multiplicación reiterada.

Simbólicamente: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}_{n \text{ veces}}$ siendo a y n números naturales.

Al número a se le llama base de la potencia, mientras que a n se le llama exponente de la potencia.

Ejemplos:

Calcula las siguientes potencias: a) 2^5 b) 4^1 c) 3^4

a) $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$

b) $4^1 = 4$

c) $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$

Todo número distinto de cero elevado al exponente cero es igual a 1: $a^0 = 1$

Ejemplos: $120^0 = 1$ $10^0 = 1$ $16540^0 = 1$

Todo número elevado al exponente 1, es igual a ese mismo número, por eso el exponente 1 por general no se escribe: $a^1 = a$

Ejemplos: $12^1 = 12$ $4^1 = 4$ $1645^1 = 1645$

Las propiedades de las potencias naturales de exponente natural son las siguientes:

1) Multiplicación de potencias de la misma base es otra potencia se la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes

Simbólicamente: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Ejemplo: Expresa como una sola potencia la multiplicación de potencias: $2^4 \cdot 2^3 \cdot 2 \cdot 2^2$

$2^4 \cdot 2^3 \cdot 2 \cdot 2^2 = 2^{4+3+1+2} = 2^{10}$

2) División de potencias de igual base, es otra potencia de la misma base cuyo exponente es la diferencia de los exponentes.

Simbólicamente: $a^m : a^n = a^{m-n}$, siempre que $m > n$

Ejemplo: $2^6 : 2^2 = 2^4$

3) Potencia de una potencia es otra potencia de igual base y cuyo exponente es la multiplicación de los exponentes.

Simbólicamente: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

Ejemplo:

Calcula las siguientes potencias de potencias: $(2^3)^2$ y $(a^b)^2$

$$(2^3)^2 = 2^3 \cdot 2 = 2^6 = 64$$

$$(a^b)^2 = a^2 \cdot b$$

4) Distributiva de la potenciación con respecto de la multiplicación y división

Simbólicamente: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ y $(a : b)^n = a^n : b^n$

Ejemplos: $(3 \cdot 2)^3 = 3^3 \cdot 2^3 = 27 \cdot 8 = 216$

$$(6 : 2)^2 = 6^2 : 2^2 = 36 : 4 = 9$$

o bien: $3^3 \cdot 2^3 \cdot 5^3 = (3 \cdot 2 \cdot 5)^3 = 30^3$

La radicación es la operación inversa a la potenciación. Encontrar la raíz enésima de un número consiste en encontrar otro número que elevado a la potencia n nos dé como resultado el número original.

Simbólicamente: $\sqrt[n]{a} = b$ si ocurre que $b^n = a$

A la expresión $\sqrt[n]{a}$ se la llama raíz o radical. En ella, al número a se le llama radicando y a n índice de la raíz.

Ejemplos:

$$\sqrt{16} = 4 \text{ porque } 4^2 = 16; \quad \sqrt[3]{125} = 5 \text{ porque } 5^3 = 125; \quad \sqrt[4]{81} = 3 \text{ porque } 3^4 = 81$$

La radicación cumple las mismas propiedades que la potenciación.

Operaciones Combinadas.

Para resolver una operación combinada debemos tener en cuenta lo siguiente:

- 1- Identificamos los términos
- 2- Resolvemos las operaciones que están entre paréntesis (cuando los haya identificamos y resolvemos los términos dentro de éstos.
- 3- Resolvemos potencias y raíces
- 4- Resolvemos multiplicaciones y divisiones
- 5- Por último, resolvemos sumas y restas.

Ejercitación

1) Efectúa las siguientes operaciones paso a paso y mencione lo efectuado

a) $12 + 8 : 2 + (18 - 9) \cdot 3 =$

b) $(12 + 8) : (2 + 18) + 9 \cdot 3 =$

c) $5 \cdot [4 + (7 - 3) \cdot 3] =$

d) $(8 - 4) : 2 + (16 - 4) : 3 - (18 : 6) =$

e) $4 \cdot 3 : 2 + (17 + 3) : (2 + 3) =$

2) Expresa como una sola potencia las siguientes multiplicaciones:

a) $5^2 \cdot 5^3 \cdot 5^5 =$



b) $x^4 \cdot x^3 \cdot x \cdot x^{12} =$

c) $3^x \cdot 3^x \cdot 3^x =$

3) Quita paréntesis y reduce:

a) $(x^2 \cdot y^3)^5 =$

b) $(5^2 b^3)^2 =$

c) $(x^2)^2 \cdot (x^3)^3 \cdot x =$

d) $(a^2)^3 \cdot b \cdot a^4 \cdot (b^4)^2 =$

e) $[(3^2)^3]^5 =$

4) Resuelvan los siguientes cálculos

a) $9 \cdot (3.5 - 14)^2 + \sqrt{36} : 2 - 4^0 \cdot 5 =$

b) $7^2 : (4 + 3) + 14 + 4 : 2 =$

c) $\sqrt[3]{125} \cdot (2 + 1) + 9^0 \cdot 3 - (13 - 3) : 2 =$

d) $\sqrt{51} \cdot 2 - 2 - 2^4 : 2 + (3 \cdot 3 - 2)^2 =$

e) $\sqrt[3]{3 + 6.4} - (8 - 2^3) + (3 + 2 \cdot 3)^2 =$

f) $2 \cdot [79 - 8 \cdot 3^2 + \sqrt{16}] - 10 =$

g) $3 + \sqrt[3]{3^2} - (\sqrt{16} - 3) - 4 : 2^2 =$

NÚMEROS ENTEROS

Ya las antiguas civilizaciones hindú y árabe observaron que algunos problemas numéricos no tenían solución entre los números hasta entonces conocidos. Esto ocurría por ejemplo con las deudas monetarias a las cuales presentaban con el signo “-” delante del número. Por ejemplo -100, indicaba una deuda de 100 monedas.

El conjunto de números enteros se designa Z , este conjunto esta formado por:

- ◆ Enteros positivos (Z^+): +1, +2, +3,... (que también se anotan: 1, 2, 3...)
- ◆ El cero: 0
- ◆ Enteros Negativos (Z^-): -1, -2, -3, -4,...

Se llama valor absoluto de un número entero a y se lo indica $|a|$ (se lee: valor absoluto de a), a la distancia desde el número hasta cero.

Ejemplo: $|5| = 5$ $|-8| = 8$ $|0| = 0$ $|-5| = 5$

-Suma de Números enteros:

Regla practica para sumar dos números enteros:

- Si tienen el mismo signo, sumamos los valores absolutos y le asignamos al resultado dicho signo. Ejemplo: $-5 + (-1) = -6$
- Si tienen distintos signos, testamos sus valores absolutos y le asignamos al resultado el signo del número de mayor valor absoluto. Ejemplo: $8 + (-2) = 6$
 $7 + (-10) = -3$

-Resta de Números enteros:

Restar un número entero es lo mismo que sumar su opuesto, es decir:

$$a - b = a + (-b) \quad \text{y} \quad a - (-b) = a + b$$



Ejemplos: $12 - 20 = 12 + (-20) = -6$; $-30 - (-10) = 30 + 10 = 40$

-Multiplicación y división de Números enteros:

Para multiplicar y para dividir **dos números enteros** debemos tener en cuenta esta regla:

- Si los dos tienen el mismo signo, el resultado es positivo.

$$\begin{array}{ll} (+) \cdot (+) = + & (+) : (+) = + \\ (-) \cdot (-) = + & (-) : (-) = + \end{array}$$

Ejemplos: $(+3) \cdot (+7) = 21$ $(+28) : (+7) = +4$
 $(-6) \cdot (-8) = 48$ $(-45) : (-9) = +5$

- Si los dos tienen distintos signos, el resultado es negativo.

$$\begin{array}{ll} (+) \cdot (-) = - & (+) : (-) = - \\ (-) \cdot (+) = - & (-) : (+) = - \end{array}$$

Ejemplos: $(+5) \cdot (-9) = -45$ $(+24) : (-6) = -4$
 $(-6) \cdot (+4) = -24$ $(-30) : (+5) = -6$

Regla: El producto o cociente de varios números distinto de cero es otro entero tal que:

- Es **positivo** si el número de factores negativos es **par**
- Es **negativo** si el número de factores negativos es **impar**.

Ejemplos: $(-1) (-2) (+5) (+1) (+3) = +30$ 2 factores negativos
 $(-1) (-2) (+5) (+1) (-3) = -30$ 3 factores negativos

-Potenciación de Números enteros:

La potenciación es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales: $a^n = a \cdot a \cdot a \dots a$ (n veces multiplicamos a)

La potenciación es una operación entre dos números a y n, llamados base y exponente, respectivamente.

Notación: $a^n = p$, **a** se llama base, **n** se llama exponente y **p** se llama potencia

Todo número, distinto de cero elevado al exponente 0 es igual a uno: $a^0 = 1$

Si la base de una potencia es un número entero, este puede ser **positivo** o **negativo**.

- Si es **positivo**, el resultado es siempre un número positivo.
- Si es **negativo** tenemos dos soluciones:

1) si el exponente es un número **par** el resultado de la potencia es un número **positivo**:

Ejemplos: $7^2 = 49$ $3^3 = 27$ $2^6 = 64$

2) si el exponente es un número **impar** el resultado de la potencia es un número **negativo**

Ejemplos: $(-2)^2 = +4$ $(-2)^4 = +16$
 $(-2)^3 = -8$ $(-2)^5 = -32$

-Radicación de Números enteros:

La radicación es una operación entre dos números a y n llamados base e índices, respectivamente: $\sqrt[n]{a}$ y se define como $\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$

Ejemplos: $\sqrt[3]{8} = 2$ pues $2^3 = 8$
 $\sqrt[3]{-8} = -2$ pues $(-2)^3 = -8$
 $\sqrt[4]{-16}$



No es posible en Z pues ningún número entero elevado el exponente **par** da por resultado en número negativo

$$\sqrt[4]{16} = \pm 2 \quad \text{pues} \quad \begin{cases} (+2)^4 = 16 \\ (-2)^4 = 16 \end{cases}$$

Regla de los signos: Si el índice es impar la raíz tiene el mismo signo del radicando.
Si el índice es par y el radicando es positivo, las raíces son dos números opuestos.
Si el índice es par y el radicando es negativo, la raíz es imposible en Z .

Ejercitación:

Resuelvan las siguientes operaciones

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| a) $150 - (14 - 6) =$ | e) $40 + 35 + 3 - 10 - 9 =$ |
| b) $(11 - 5) - (9 - 3) =$ | f) $3 - 2 - (-8) + 4 - 10 - 6 =$ |
| c) $(4 - 3) + (5 - 2) =$ | g) $-(-10) + (-8) - 3 + (-1) =$ |
| d) $(9 - 4) - (9 + 4) =$ | h) $-1 - 2 - 3 + (-6) - (-4) =$ |

Resuelva los siguientes productos:

- a) $(-8)(+9)(-4) =$
 b) $(-4)(-5)(-6)(-8) =$
 c) $(-30)(+4)(-5) =$
 d) $(-8)(-10)(+2)(-3) =$

Resuelva los siguientes cocientes:

- a) $(-24) : (-8) =$
 b) $(-56) : (-7) =$
 c) $(33) : (-11) =$
 d) $(-36) : (+12) =$

Calcule cada una de las siguientes potencias:

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| a) $(-8)^2 =$ | d) $(-2)^5 =$ | f) $(-1)^0 =$ |
| b) $(-10)^3 =$ | e) $(+3)^3 =$ | |

Calcula las siguientes raíces:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| a) $\sqrt[3]{1000} =$ | b) $\sqrt[4]{16} =$ | c) $\sqrt[5]{-32} =$ |
| d) $\sqrt[6]{64} =$ | e) $\sqrt[3]{-125} =$ | |

Operaciones Combinadas:

- a) $(-1)^3 - 3 \cdot \sqrt{16 + (-3)^2} - 2 \cdot [3 \cdot (-4) + 12 : (-6)] =$
 b) $(-3) \cdot (-2)^3 + \sqrt[3]{8} : \sqrt[3]{-1} + (-3 \cdot 6) : (-1)^7 =$
 c) $\sqrt[3]{-54} : 2 + (-2 \cdot 3 + 3^2)^0 - (-4)^1 =$
 d) $(-7 + 5)^4 : 2^3 - \sqrt{25} \cdot (-2) =$
 e) $(-3)^3 : \sqrt{9} - 12 : (-2)^2 + \sqrt{64} =$
 f) $[(-7) - (-1)^2]^2 : (-2)^3 - (-16) : 2 =$
 g) $3 \cdot (-2 + 6 \cdot (-3)) : (-4) + (-3)^0 - 4 \cdot (-2) =$
 h) $\sqrt[3]{2 + 3 \cdot 2} - 2^2 + 3 : (-5 + 4) - \sqrt{9 + 16} =$

i) $(3 - 2 + 5)^0 - (-2)^3 + 4 \cdot (-3) - 5 \cdot (-4 + 4) - \sqrt{9+16} =$

j) $\sqrt[3]{(-2)^2 + (-2)^2 + 1 - (-3) + (-4 + 6)^3} : (-2) =$

NÚMEROS RACIONALES

El cociente entre dos números enteros a y b (con b distinto de cero) representa un número racional. Para simbolizarlos se lo escribe del siguiente modo:

$$\frac{a}{b} \rightarrow \text{Numerador de la fracción}$$

$$b \rightarrow \text{Denominador de la fracción}$$

El conjunto de los números racionales esta formado por el conjunto de los números enteros y los números fraccionarios y se representan con la letra Q. Los números racionales pueden expresarse mediante una fracción o una expresión decimal,

Ejemplos: $2 = \frac{4}{2}$ $0,5 = \frac{1}{2}$ $-5 = \frac{-15}{3}$ $1,4 = \frac{7}{5}$ $0 = \frac{0}{9}$

Simplificación de Fracciones:

Para simplificar fracciones dividimos al numerador y al denominador por el mismo número.

Ejemplo: $\frac{120}{210}$ puede simplificarse por 5; entonces $\frac{120 : 5}{210 : 5} = \frac{24}{42}$

Podemos seguir simplificando esta fracción hasta obtener una fracción irreducible.

Operaciones con Números Racionales:

Adición:

Definición: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{b \cdot d}$
--

Ejemplos: A) $\frac{3}{5} + \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 7 + 2 \cdot 5}{5 \cdot 7} = \frac{21 + 10}{35} = \frac{31}{35}$

B) $\frac{5}{12} + \frac{3}{8} = \frac{5 \cdot 8 + 3 \cdot 12}{12 \cdot 8} = \frac{40 + 36}{96} = \frac{76}{96}$

Cuando aplicamos la definición debemos simplificar el resultado, siempre que sea posible. En los ejemplos anteriores es posible simplificar el ejemplo B.

Otra forma de resolver las sumas y restas es obteniendo el mínimo común múltiplo de los denominadores, luego se divide por cada denominador y el resultado se multiplica por en numerador. Este caso se aplica cuando los denominadores no son números primos.

$$\frac{8}{45} + \frac{7}{30} - \frac{1}{15} = \frac{16 + 21 - 6}{90} = \frac{31}{90}$$

90:45 = 2

Sustracción de números Racionales:

Regla: Para restar dos números racionales, se suma al primero el opuesto del segundo.

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left(-\frac{c}{d}\right)$$

Ejemplo: $-\frac{3}{4} - \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{3}{4} + \frac{5}{3} = \frac{-3.3 + 5.4}{12} = \frac{-9 + 20}{12} = \frac{11}{12}$

Multiplicación de números racionales

Definición: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$
--

Ejemplo: $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 7} = \frac{6}{35}$

Cuando sea posible, conviene simplificar (numerador con denominador) antes de realizar la operación

$$\frac{1}{5}$$

Ejemplo: $\frac{12}{35} \cdot \frac{25}{36} = \frac{1.5}{7.3} = \frac{5}{21}$

La regla de los signos es la misma que enunciamos para la multiplicación de números enteros.

División de números racionales

Regla: Para dividir dos números racionales, se multiplica el primero por el inverso del segundo y se simplifica el resultado siempre que sea posible

En símbolo: $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = a \cdot d / bc$

Potenciación de números racionales

1) Potencia de exponente natural

Para la potencia de exponente natural sigue siendo válida la definición general de potencia enésima, que se dio para números enteros.

En símbolo: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

También son válidas las definiciones para la potencia de exponente cero y de exponente uno.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^0 = 1$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^1 = \frac{a}{b}$$

La regla de los signos es la misma que enunciamos para la potenciación de números enteros.

Ejemplos: $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}$$

2) Potencia de exponente negativo:

Toda potencia de exponente negativo se puede transformar en una potencia cuya base es la inversa de la base dada de la potencia

$$\text{En s\u00edmbolo: } a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

Ejemplos:

$$\text{a) } 4^{-3} = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64} \qquad \text{c) } \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$$

$$\text{b) } \left(-\frac{1}{2}\right)^{-5} = (-2)^5 = -32$$

Radicaci\u00f3n de n\u00fameros racionales

La definici\u00f3n general de ra\u00edz en\u00e9sima de n\u00fameros enteros sigue siendo v\u00e1lida para los racionales.

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{x}{y} \Leftrightarrow \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{a}{b}$$

Regla practica:

$$\boxed{\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}}$$

La regla de los signos es la misma que hemos enunciado para la radicaci\u00f3n de n\u00fameros enteros

$$\text{Ejemplos: } \sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5} \quad \text{pues} \quad \left(\pm \frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$$

$$\sqrt[3]{-\frac{27}{243}} = -\frac{3}{7} \quad \text{pues} \quad \left(-\frac{3}{7}\right)^3 = -\frac{27}{243}$$

Expresi\u00f3n decimal de un n\u00famero Racional

Todo n\u00famero racional puede expresarse mediante una fracci\u00f3n o un n\u00famero decimal. Para obtener la expresi\u00f3n decimal de una fracci\u00f3n se divide el numerador por el denominador. En algunos casos, la cuenta de dividir no termina dado que el resto nunca llega a ser cero. Entonces decimos que la expresi\u00f3n decimal es peri\u00f3dica. Por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = 0,5 \qquad \frac{3}{4} = 0,75 \qquad \frac{-2}{3} = -0,666\dots = -0,\widehat{6} \qquad \frac{11}{6} = 1,8333\dots = 1,8\widehat{3}$$

Las fracciones cuyo denominador es una potencia de 10 (10,100, 1000,... o sea es un 1 seguido de ceros) reciben el nombre de fracciones decimales.

$$\text{Ejemplos: } \frac{7}{100} \qquad \frac{14}{10} \qquad \frac{347}{10000} \qquad \frac{59}{1000}$$

Expresi\u00f3n fraccionaria de un n\u00famero decimal

Toda expresi\u00f3n decimal limitada puede anotarse como fracci\u00f3n: como numerador se coloca el n\u00famero completo (sin la coma) y como denominador un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga la expresi\u00f3n decimal.



Ejemplos: $0,06 = \frac{6}{100}$ $0,352 = \frac{352}{1000}$ $12,35 = \frac{1235}{100}$

Conversión de una expresión decimal periódica en fracción:

1) Regla: Toda expresión decimal periódica pura, de parte entera nula, se puede transformar en una fracción, tal que: el numerador es el periodo y el denominador esta formado por tantos nueves como cifras tiene el periodo.

Ejemplos: $0,\bar{5} = \frac{5}{9}$ $0,\bar{371} = \frac{371}{999}$

2) Regla: Toda expresión periódica mixta, de parte entera nula, se puede transformar en una fracción, tal que: el numerador es igual al número que forma la parte no periódica seguida del período, menos la parte no periódica y el denominador esta formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica

Ejemplos: $0,34\bar{5} = \frac{345-34}{900} = \frac{311}{900}$ $0,9\bar{364} = \frac{9364-9}{9990} = \frac{9355}{9990}$

Cuando la parte entera es distinta de cero la expresión decimal es igual a la parte entera mas la fracción que resulta al aplicar la regla correspondiente.

Ejemplo: $4,1\bar{9} = 4 + \frac{19}{99} = \frac{396+19}{99} = \frac{415}{99}$
 $1,3\bar{25} = 1 + \frac{325-3}{990} = \frac{990+325-3}{990} = \frac{1312}{990}$

Ejercitación:

Calcula las siguientes sumas:

a) $\frac{7}{24} + \frac{5}{12} =$

d) $\frac{9}{5} + \frac{1}{6} + \frac{3}{10} + \frac{7}{15} =$

b) $\frac{7}{5} + \frac{8}{15} + \frac{11}{60} =$

e) $\frac{7}{20} + \frac{3}{40} + \frac{1}{80} + \frac{3}{15} =$

c) $\frac{3}{8} + \frac{1}{6} + \frac{5}{12} =$

Realiza las siguientes operaciones:

a) $\frac{3}{8} - \frac{1}{12} =$

c) $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} - 1 =$

d) $-2 + \frac{5}{3} + \frac{2}{3} - \frac{7}{6} =$

b) $4 - \frac{7}{2} =$

d) $\frac{3}{8} - \frac{1}{4} - \frac{5}{2} =$

Calcula los siguientes productos:

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{6}{7} =$

d) $\frac{24}{45} \cdot \frac{36}{32} \cdot \frac{33}{81} \cdot \frac{15}{55} =$

b) $-3 \cdot \frac{4}{9} =$

e) $-\frac{16}{49} \cdot \frac{14}{18} \cdot \frac{35}{72} \cdot \left(-\frac{27}{25}\right) =$

c) $\frac{12}{35} \cdot \frac{21}{30} \cdot \frac{25}{18} =$



Calcula las siguientes potencias:

a) $\left(-\frac{5}{7}\right)^3 =$

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} =$

b) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 =$

d) $\left(\frac{9}{5}\right)^{-1} =$

e) $\left(-\frac{1}{4}\right)^{-4} =$

Calcula los siguientes cocientes:

a) $\frac{3}{4} : \frac{7}{8} =$

d) $-\frac{4}{9} : \left(-\frac{10}{15}\right) =$

b) $\frac{5}{12} : \frac{5}{6} =$

e) $\frac{7}{8} : \left(-\frac{14}{20}\right) =$

c) $-\frac{4}{5} : \frac{6}{25} =$

Calcula las siguientes raíces:

a) $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}} =$

c) $\sqrt[5]{-100000} =$

d) $\sqrt[3]{\frac{1}{64}} =$

b) $\sqrt{\frac{4}{36}} =$

d) $\sqrt[4]{\frac{216}{81}} =$

Transformen en fracción las siguientes expresiones decimales:

a) 14,6 =

f) $0,\widehat{6} =$

b) -0,32 =

g) $0,\widehat{56} =$

c) 31,63 =

h) $-2,\widehat{31} =$

d) 0,729 =

i) $4,\widehat{235} =$

Resuelva los siguientes ejercicios combinados

a. $\frac{1}{2} - 0,25 + \frac{3}{4} - 0,\widehat{6} =$

b. $3 + 2,25 - \frac{1}{4} - 0,1\widehat{3} =$

c. $5 - \frac{3}{2} + 0,\widehat{3} =$

d. $2,\widehat{3} - \frac{1}{3} + 1,25 =$

e. $\left(1 - \frac{5}{3}\right) \cdot \frac{3}{4} + 2^{-1} - \sqrt{\frac{1}{25}} =$

f. $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-2} + \frac{3}{10} : 4^{-1} - \sqrt{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{10}{3}} =$

g. $\sqrt{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{\frac{1}{12}} + \left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(\frac{3}{5} : 2 - \frac{2}{5}\right)^{-1} =$



$$h. \sqrt[3]{2^{-3} + \frac{13}{4} - \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} + \left(\frac{3}{8}\right)^{-1}} : 4 =$$

RAZONES Y PROPORCIONES

Frecuentemente has oído o has utilizado expresiones como las siguientes:

Votaron **6 mujeres por cada 7 hombres**

En esta ciudad hay **1 automóvil por cada 5 personas.**

Decimos que la razón del número de mujeres al número de varones es de **6 a 7** o bien que el número de mujeres es $\frac{6}{7}$ del número de varones.

Análogamente la razón del número de automóviles al número de personas es de 1 a 5 o bien, que el número de automóviles es $\frac{1}{5}$ del número de personas.

Definición: Se llama razón entre dos números a y b ($b \neq 0$), al cociente de la división de a por b.

El primer número, o sea a, recibe el nombre de antecedente y el segundo número, o sea b, recibe el nombre de consecuente de la razón.

a es a b se expresa: a : b o $\frac{a}{b}$ → antecedente
b → consecuente

Decir que hay 6 mujeres por cada 7 varones equivale a decir que hay 12 mujeres por cada 14 varones.

La razón de 6 a 7 es igual a la razón de 12 a 14: $\frac{6}{7} = \frac{12}{14}$

Análogamente la razón de 1 a 5 es igual a la razón de 3 a 15: $\frac{1}{5} = \frac{3}{15}$.

Definición: La igualdad de dos razones se llama proporción: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, se lee:

a es a b como c es a d.
a y d se llaman extremos de la proporción
b y c se llaman medios de la proporción.

Propiedad Fundamental de las proporciones: en toda proporción el producto de los

extremos es igual al producto de los medios: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c$

En las proporciones:

a) $\frac{6}{7} = \frac{12}{14}$ es $6 \times 14 = 7 \times 12$
 $84 = 84$

b) $\frac{1}{5} = \frac{3}{15}$ es $1 \times 15 = 5 \times 3$
 $15 = 15$

Para calcular un extremo o un medio de una proporción debemos utilizar la propiedad fundamental.

Ejemplo: Calculen el valor de x

$$\frac{2x - \frac{1}{3}}{4} = \frac{\frac{1}{4}x - 2}{3}$$

$$\left(2x - \frac{1}{3}\right) \cdot 3 = 4 \cdot \left(\frac{1}{4}x - 2\right)$$

$$6x - 1 = x - 8$$

$$6x - x = -8 + 1$$

aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones

aplicamos propiedad distributiva

separamos en cada miembro términos semejante

$$5x = -7 \Rightarrow x = -\frac{7}{5}$$

1) Hallen el valor de k que verifique la proporcionalidad

a) $\frac{k+1}{6} = \frac{k}{4}$ b) $\frac{k}{2+0,1} = \frac{0,2^2}{0,008}$ c) $\frac{\sqrt{0,01} + \left(\frac{1}{2}\right)^2}{\frac{3}{2}+1} = \frac{\frac{3}{2}+1}{k}$ d) $\frac{\frac{k}{2}+1}{3} = \frac{3k-2}{6}$

e) $\frac{1}{k} = \frac{4}{k-1}$

ECUACIONES

Ecuaciones de primer grado

Una **ecuación** es una igualdad en la que hay por lo menos un dato desconocido, es decir una incógnita, y resolverla significa encontrar el o los valores que hacen verdadera la igualdad

Una ecuación lineal o de primer grado es aquella cuya forma general es: $ax + b = 0$, siendo a y b números reales y $a \neq 0$

Resolución de una ecuación

En toda ecuación se distinguen dos miembros en la igualdad

a) $\underbrace{-3\left(2x - \frac{5}{6}\right)}_{\text{Primer miembro de la igualdad}} = \underbrace{\left(-\frac{5}{4}x + 3\right)}_{\text{segundo miembro de la igualdad}} : 0,5$

Primer miembro de la igualdad segundo miembro de la igualdad

$$-6x + \frac{5}{2} = -\frac{5}{2}x + 6 \longrightarrow \text{Aplicamos propiedad distributiva en cada miembro}$$

$$-6x + \frac{5}{2}x = 6 - \frac{5}{2} \longrightarrow \text{Agrupamos términos semejantes en cada uno de los miembros}$$

$$-\frac{7}{2}x = \frac{7}{2} \longrightarrow \text{Resolvemos cada miembro}$$

$$x = \frac{7}{2} : -\frac{7}{2}$$

$$x = -1$$

$$b) 2y - 3 + 3\left(\frac{2}{3}y - \frac{1}{6}\right) = y - \frac{5}{4}(y - 1)$$

$$2y - 3 + 2y - \frac{1}{2} = y - \frac{5}{4}y + \frac{5}{4}$$

$$4y + \frac{1}{4}y = \frac{5}{4} + \frac{7}{4}$$

$$\frac{17}{4}y = \frac{19}{4}$$

$$y = \frac{19}{4} : \frac{17}{4} \Rightarrow y = \frac{19}{17}$$

Ejercitación:

1) Resuelvan las siguientes ecuaciones

$$a) 3(x - 1) + 2 = -4x + 1$$

$$b) 3 \cdot (0,2x - 1) + 1,2 = 0,5 + x$$

$$c) \frac{1}{3}x - 1 = 2\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{5}\right)$$

$$d) \frac{x - 1}{2} + 1 = \frac{1}{5}x$$

$$e) \frac{3x - 1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{x + 1}{3}$$

$$f) 5 \cdot \left(0,2x + \frac{1}{3}\right) + \frac{3}{2} = \frac{1}{6}x$$

$$g) 2x - x + 3 + 9 = 4x + 39$$

$$h) 2 \cdot (x + 3) = 6$$

$$i) 5 \cdot (x + 0,4) - 2,8 = 17,2$$

$$j) \frac{2}{3}x - \frac{5}{2} = 5 + \frac{1}{4}x$$

$$j) \frac{2}{5}x - 1 = \frac{x - 2}{4}$$

2) En las siguientes igualdades despeje la variable que se pide:

$$a) x + xm + 2x + 2m = 4m \cdot (3x + 6) \quad \text{Despeje } m \text{ y } x$$

$$b) C_f = c + \frac{c \cdot i \cdot t}{100} \quad \text{Despejar } t \text{ y } c$$

$$c) a_n = a_1 + (n - 1)d \quad \text{Despejar } n$$

$$d) S = \frac{a_n \cdot r - a_1}{r - 1} \quad \text{Despejar } r$$

Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

Consideremos un conjunto de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y - 9 = 0 \end{cases}$$

El conjunto de dos ecuaciones se llama sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Si ambas ecuaciones son de primer grado es un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Para indicar que forman un sistema, se abarcan con una llave.

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

Resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas significa hallar el conjunto de raíces comunes, es decir, la intersección de los conjunto solución de ambas ecuaciones. Existen diversos métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nosotros estudiaremos solamente el método algebraico llamado método de igualación

Ejemplo: Resolver el siguiente sistema aplicando método de igualación.



$$\begin{cases} 3x + y = 1 & \text{I} \\ 4x - 2y = 18 & \text{II} \end{cases}$$

1) despejamos la misma variable en ambas ecuaciones

$$\begin{aligned} 3x + y &= 1 \\ y &= 1 - 3x \quad \text{(I)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4x - 2y &= 18 \\ -2y &= 18 - 4x \\ y &= (18 - 4x) : (-2) \quad \text{(II)} \end{aligned}$$

2) igualamos (I) y (II)

$$1 - 3x = (18 - 4x) : (-2)$$

3) Resolvemos la ecuación que obtuvimos y averiguamos el valor de x

$$\begin{aligned} 1 - 3x &= (18 - 4x) : (-2) \\ (1 - 3x) \cdot (-2) &= 18 - 4x \\ -2 + 6x &= 18 - 4x \\ 6x + 4x &= 18 + 2 \\ 10x &= 20 \\ x &= 20 : 10 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

4) Reemplazamos el valor de x que obtuvimos, en (I) o en (II) para averiguar el valor de y.

$$\begin{aligned} y &= 1 - 3 \cdot 2 \quad \text{(se reemplazo en (I))} \\ y &= -5 \end{aligned}$$

La solución que obtuvimos es $x = 2$; $y = -5$.

Ejercitación:

1) Resuelve por igualación los siguientes sistemas de ecuaciones.

a)
$$\begin{cases} x = 2(11 - y) \\ y = 5(x - 5) + 3 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 4x - 3y = 24 \\ \frac{x}{5} = \frac{y}{4} \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x = (2y - 1) \cdot 3 + 3y \\ (6x - 3) : 3 = + 3y = 14 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 2x - 5y = 16 \\ x + 3y = -3 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} -\frac{2}{5}x + 3y = 9 \\ 4x + 6y = \frac{1}{4} \end{cases}$$

f)
$$\begin{cases} 2x - 5y = 16 \\ 4x - 10y = 32 \end{cases}$$

2) Escriba el concepto de:

- Sistema compatible determinado
- Sistema incompatible
- Sistema compatible indeterminado

3) Represente gráficamente los siguientes sistemas.

a)
$$\begin{cases} 3x - 5y = 16 \\ x + 3y = -8 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} -5x + 2y = 16 \\ 35x + 14y = -3 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} 7x - 9y = 0 \\ -28x + 36y = 0 \end{cases}$$

- Establezca la solución del sistema de ecuaciones.
- Clasifique los SEL.

4) Responda:

¿Qué diferencia existe entre el Método Gráfico y el Analítico? ¿Cuál es más preciso?

5) Plantee y resuelva los siguientes problemas utilizando SEL.

- a) Un licenciado en sistemas de computación gastó \$4100 en comprar impresoras a \$400 y software a \$60. Si la suma del número de impresoras y el número de software que compró es 23. ¿Cuántas impresoras y cuánto software compró?
- b) Un padre tiene el doble de la edad de su hijo, y la suma de ambas edades es igual a 54 años. ¿Cuántos años tiene cada uno?
- c) En un vivero hay 3500 plantas entre rosas y jazmines. Si el número de rosas supera en 486 al número de jazmines. ¿Cuántas plantas hay de cada clase?
- d) Hace 4 años, Ana tenía 8 veces la edad de Sofia. Actualmente, la edad de Ana es 4 veces la edad de Sofia. ¿cuál es la edad de cada una?

Ecuaciones de segundo grado

La forma general de las ecuaciones de segundo grado es:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde $a \neq 0$; a, b y c son números reales.

Ecuaciones incompletas

1) Si $b = 0$, la ecuación de segundo grado es incompleta de la forma **$ax^2 + c = 0$**

Para resolver este tipo de ecuaciones se despeja el valor de x, teniendo en cuenta que

$$\sqrt{x^2} = \pm x$$

Ejemplo: a) $x^2 - 9 = 0$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm \sqrt{9}$$

$$x_1 = 3 \text{ y } x_2 = -3$$

b) $-2x^2 + 50 = 0$

$$-2x^2 = -50$$

$$x^2 = -50 : -2$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm \sqrt{25}$$

$$x_1 = 5 \text{ y } x_2 = -5$$

2) Si $c = 0$, la ecuación de segundo grado es incompleta de la forma: **$ax^2 + bx = 0$**

Para resolver este tipo de ecuaciones, se debe tener en cuenta que:

$$m \cdot n = 0 \Rightarrow m = 0 \vee n = 0$$

Ejemplo: $2x^2 - 3x = 0$

$$x(2x - 3) = 0$$


$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ 2x_2 - 3 = 0 \\ 2x_2 = 3 \\ x_2 = \frac{3}{2} \end{array} \right.$$

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

Triángulos rectángulos

Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto.

El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados, catetos.





$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 90^\circ$$

$$\overline{ab}^2 = \overline{ac}^2 + \overline{cb}^2$$

Razones Trigonómicas

Se llaman razones trigonométricas a aquellas que relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo.

Para cada uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, uno de los catetos es el adyacente y el otro es el opuesto.



Las razones trigonométricas se definen de la siguiente manera:

Seno de un ángulo: es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa

$$\text{Sen } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \quad \text{sen } \hat{\alpha} = \frac{\overline{cb}}{\overline{ab}} \wedge \text{sen } \hat{\beta} = \frac{\overline{ac}}{\overline{ab}}$$


Coseno de un ángulo: es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa

$$\text{Cos } \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \quad \text{cos } \hat{\alpha} = \frac{\overline{ac}}{\overline{ab}} \wedge \text{cos } \hat{\beta} = \frac{\overline{cb}}{\overline{ab}}$$

Tangente de un ángulo: es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente.

$$\text{Tg } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} \quad \text{tg } \hat{\alpha} = \frac{\overline{cb}}{\overline{ac}} \wedge \text{tg } \hat{\beta} = \frac{\overline{ac}}{\overline{cb}}$$

Ejemplo: Hallen el valor de las razones trigonométricas del siguiente triángulo



$$\text{sen}\hat{\alpha} = \frac{6\text{cm}}{10\text{cm}} = \frac{3}{5}$$

$$\text{cos}\hat{\alpha} = \frac{8\text{cm}}{10\text{cm}} = \frac{4}{5}$$

$$\text{tg}\hat{\alpha} = \frac{6\text{cm}}{8\text{cm}} = \frac{3}{4}$$

Si lo que se conoce es el ángulo, para calcular las razones trigonométricas se utiliza la calculadora científica

Resolución de triángulos rectángulos

Resolver un triángulo rectángulo significa hallar el valor de sus tres lados y el valor de los dos ángulos agudos. Para ello se utiliza el teorema de Pitágoras, la propiedad de los ángulos agudos y las razones trigonométricas.


1) Dados un ángulo agudo y uno de sus lados

Para calcular el \hat{b} debe aplicarse la propiedad de los ángulos agudos **a**

$$\hat{a} + \hat{b} = 90^\circ \Rightarrow \hat{b} = 90^\circ - \hat{a} \Rightarrow \hat{b} = 90^\circ - 52^\circ \Rightarrow \hat{b} = 38^\circ$$

Para calcular el lado \overline{ab} debe aplicarse la razón trigonométrica que relacione los dos datos con el lado.

$$\text{cos}\hat{a} = \frac{\overline{ac}}{\overline{ab}} \Rightarrow \overline{ab} = \frac{\overline{ac}}{\text{cos}\hat{a}} \Rightarrow \overline{ab} = \frac{4\text{cm}}{\text{cos}52^\circ} \Rightarrow \overline{ab} = \frac{4\text{cm}}{0,62} = 6,45\text{cm}$$



Para calcular el lado \overline{cb} debe razonarse de la misma manera.

$$\text{tg}\hat{a} = \frac{\overline{cb}}{\overline{ac}} \Rightarrow \overline{cb} = \text{tg}\hat{a} \cdot \overline{ac} \Rightarrow \overline{cb} = \text{tg}52^\circ \cdot 4\text{cm} \Rightarrow \overline{cb} = 1,28 \cdot 4 \Rightarrow \overline{cb} = 5,12\text{cm}$$

2) Dados dos lados

Para calcular el lado \overline{mp} debe aplicarse el teorema de Pitágoras.

$$\overline{mr}^2 = \overline{rp}^2 + \overline{mp}^2 \Rightarrow \overline{mp} = \sqrt{\overline{mr}^2 - \overline{rp}^2} \Rightarrow \overline{mp} = \sqrt{(8\text{cm})^2 - (5\text{cm})^2}$$


$$\overline{mp} = \sqrt{64\text{cm}^2 - 25\text{cm}^2} = 6,24\text{cm}$$

Para calcular el \hat{r} , debe aplicarse una razón trigonométrica que relacione los dos datos con el ángulo





$$\text{cos}\hat{r} = \frac{\overline{rp}}{\overline{mr}} \Rightarrow \text{cos}\hat{r} = \frac{5\text{cm}}{8\text{cm}} \Rightarrow \text{cos}\hat{r} = 0,625 \Rightarrow \hat{r} = 51^\circ 18' 4''$$

Para calcular el ángulo \hat{m} , debe razonarse de la misma manera



$$\text{sen}\hat{m} = \frac{\overline{rp}}{\overline{mr}} \Rightarrow \text{sen}\hat{m} = \frac{5\text{cm}}{8\text{cm}} \Rightarrow \text{sen}\hat{m} = 0,625 \Rightarrow \hat{m} = 38^\circ 40' 56''$$



1) Hallar el valor de x en cada uno de los siguientes triángulos



2) Resuelve los siguientes triángulos rectángulos




3) Indique con verdadero (V) o falso (F)

a. $\text{sen}\hat{\alpha} = \frac{AC}{AB}$

b. $\text{cos}\hat{\beta} = \frac{AB}{AC}$

c. $\text{tg}\hat{\beta} = \frac{AB}{CB}$



- 4) De un triángulo rectángulo se sabe que uno de sus ángulos agudos es 40° y que el cateto opuesto a éste mide 10m. Calcula el ángulo y los lados que faltan.
- 5) Calcula la altura de la torre si nuestro personaje está a 7 m de la base de la torre, el ángulo con el que está observando la cúspide es de 60° y sostiene el artillugio a una altura de 1,5 m.
- 6) Un techo a dos aguas tiene 7m de ancho en su base y 3m de altura. Calculen la medida aproximada del ángulo que forma con la pared
- 7) Se desea construir una rampa que permita el acceso en sillas de ruedas en un auditorio que esta a 1m sobre el nivel de la calle. Si el espacio que se dispone para construir la rampa es de 5m ¿qué ángulo va a formar con el plano de la calle? ¿Cuál será la longitud de la rampa?